

Voorstel Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar 2023 innovatieset

Diabetes mellitus type 2

Indicatornr	Omschrijving (InEen)
1	Percentage diabetespatiënten 70 jaar of jonger heel jaar in zorgprogramma met bepaling albumine/kreatinineratio en een positieve uitslag (≥ 3.0 mmol/l) zonder RAS remmer
2	Percentage diabetespatiënten 80 jaar of ouder heel jaar in zorgprogramma met bepaling HbA _{1c} en een uitslag van 53 mmol/mol of lager met gebruik van meerdere glucose verlagende middelen ¹
3	Percentage diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met persoonlijke streefwaarde ² glucose of met persoonlijke streefwaarde HbA _{1c} of met persoonlijke streefwaarde LDL of met persoonlijke streefwaarde systolische bloeddruk
4	Percentage diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met thuismeting systolische bloeddruk
5	Percentage diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met meting stappenteller
6	Percentage diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma 70 jaar of jonger met doorgemaakt HVZ event en lipidenverlager
7	Percentage diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met een individueel zorgplan (izp)
8	Percentage diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma 70 jaar of jonger en een HbA _{1c} bepaling in de afgelopen 12 maanden en een uitkomst van 53 mmol/mol of lager (≤ 53)

¹ Deze indicator kan worden gebruikt om overbehandeling van diabetes type 2 bij ouderen te monitoren.

² De waarde (of bereik) voor een uitslag van een bepaling die de huisarts haalbaar acht voor deze patiënt en is afgesproken met de patiënt. (Bron: HIS-Referentiemodel NHG <https://referentiemodel.nhg.org/node/1439>)

COPD

Indicatornr	Omschrijving (InEen)
1	Percentage COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie ziektelast is vastgelegd
2	Percentage COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma met ziektelast 'licht'
3	Percentage COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma met ziektelast 'verhoogd'
4	Percentage patiënten heel jaar in zorgprogramma met COPD en met registratie BMI in de afgelopen 12 maanden én met registratie 'ongewenst gewichtsverlies' in de afgelopen 12 maanden
5	Percentage patiënten heel jaar in zorgprogramma met COPD met registratie van de BMI in de afgelopen 12 maanden én met registratie 'ongewenst gewichtsverlies' in de afgelopen 12 maanden waarbij BMI < 21 of 'ongewenst gewichtsverlies' met uitkomst 'ja'
6	Percentage COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma met een individueel zorgplan (izp)
7	Percentage COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma met meting stappenteller

Hart- en Vaatziekten

Indicatornr	Omschrijving (InEen)
1	Percentage HVZ patiënten heel jaar in zorgprogramma met persoonlijke streefwaarde LDL of met persoonlijke streefwaarde systolische bloeddruk
2	Percentage HVZ patiënten heel jaar in zorgprogramma met thuismeting systolische bloeddruk
3	Percentage HVZ patiënten heel jaar in zorgprogramma met meting stappenteller
4	Percentage HVZ patiënten heel jaar in zorgprogramma met een individueel zorgplan (izp)

VVR (verhoogd/zeer hoog risico)³

Indicatornr	Omschrijving (InEen)
1	Percentage VVR (hoog risico/zeer hoog risico) patiënten heel jaar in zorgprogramma met persoonlijke streefwaarde LDL of met persoonlijke streefwaarde systolische bloeddruk
2	Percentage VVR (hoog risico/zeer hoog risico) patiënten heel jaar in zorgprogramma met thuismeting systolische bloeddruk
3	Percentage VVR (hoog risico/zeer hoog risico) patiënten heel jaar in zorgprogramma met meting stappenteller
4	Percentage VVR (hoog risico/zeer hoog risico) patiënten heel jaar in zorgprogramma met een individueel zorgplan (izp)

³ In het zorgprogramma VVR (verhoogd vasculair risico) worden patiënten opgenomen met een verhoogd en/of zeer verhoogd risico (volgens de SCORE-tabel) zonder manifeste hart- en vaatziekten of een doorgemaakt event.

GGZ

Indicatornr	Omschrijving (InEen)
	Percentage patiënten GGZ in zorgprogramma
	Percentage patiënten in zorgprogramma GGZ, ingestroomd in 2020
	Percentage patiënten in zorgprogramma GGZ, uitgestroomd in 2020
	Percentage patiënten verwezen naar specialistische GGZ
1	Percentage patiënten in zorgprogramma GGZ met individueel zorgplan (IZP)
2	Percentage patiënten in zorgprogramma GGZ met wie persoonlijke doelen zijn geformuleerd
3	Percentage patiënten in zorgprogramma GGZ bij wie e-health binnen blended care wordt toegepast
4	Percentage patiënten in zorgprogramma GGZ bij wie consultatie (door bijvoorbeeld psychiater, psycholoog, psychotherapeut, orthopedagoog of verslavingsdeskundige) is ingezet
5	Percentage patiënten in zorgprogramma GGZ bij wie de patiëntervaring is gemeten

Kwetsbare Ouderen

Noemer: Aantal patiënten heel jaar opgenomen in zorgprogramma kwetsbare ouderen

Indicatornr	Omschrijving (InEen)
1	Percentage patiënten heel jaar in zorgprogramma kwetsbare ouderen met meting patiëntervaring
2	Percentage patiënten heel jaar in zorgprogramma kwetsbare ouderen voor wie specialist ouderengeneeskunde is geconsulteerd in de afgelopen 2 jaar
3	Percentage patiënten heel jaar in zorgprogramma kwetsbare ouderen met diastole bloeddruk < 70 mm Hg

Hartfalen

Indicatornr	Omschrijving (InEen)
	Prevalentie
	Regie: verdeling hoofdbehandelaar huisarts – specialist
	Percentage patiënten in eerste lijn, maar niet in zorgprogramma (geen programmatische zorg)
1	Percentage patiënten met hartfalen heel jaar in zorgprogramma met registratie van type hartfalen (labcode type hartfalen) ⁴
2	Percentage patiënten met hartfalen heel jaar in zorgprogramma van wie de ernst hartfalen (NYHA klasse) is vastgelegd
3	Percentage patiënten met hartfalen heel jaar in zorgprogramma met registratie van polsfrequentie
4	Percentage patiënten met hartfalen heel jaar in zorgprogramma met registratie van polsritme
5	Percentage patiënten met HFrEF heel jaar in zorgprogramma met voorschrift RASremmer
6	Percentage patiënten met HFrEF heel jaar in zorgprogramma met voorschrift betablokker
7	Percentage hartfalen patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd
8	Percentage hartfalenpatiënten heel jaar in zorgprogramma dat rookt

⁴ Om onderscheid te maken tussen type hartfalen is er een labcode voorhanden (HFTYKH) en geen aparte ICPC

Atriumfibrilleren

Indicatornr	Omschrijving (InEen)
	Prevalentie
	Regie: verdeling hoofdbehandelaar huisarts – specialist
	Percentage patiënten in eerste lijn, maar niet in zorgprogramma (geen programmatische zorg)
1	Percentage patiënten met atriumfibrilleren dat een antiarrhythmicum krijgt voorgeschreven (ATC Co1B)
2	Percentage patiënten met atriumfibrilleren heel jaar in zorgprogramma met voorschrift DOAC of een Vitamine K antagonist
3	Percentage patiënten met atriumfibrilleren heel jaar in zorgprogramma met voorschrift Trombocyten aggregatieremmers zonder DOAC of vitamine K antagonist
4	Percentage patiënten met atriumfibrilleren heel jaar in zorgprogramma zonder antistolling bij wie geen CHA ₂ DS ₂ -VSc score in de laatste 2 jaar is geregistreerd.

Chronische nierschade

Indicatornr	Omschrijving (InEen)
1	<p>Percentage patiënten met chronische nierschade en met urineonderzoek op albuminurie (albumine creatinineratio) in de afgelopen 12 maanden met een matig of sterk verhoogde albuminurie (≥ 3.0 mg/mmol) zonder chronische medicatie voor een RAS-remmer (< 2 voorschriften in afgelopen 12 maanden)</p> <p>LET OP: dit betreft alle patiënten in de huisartspraktijk ongeacht zorgprogramma of hoofdbehandelaar. De noemer is: patiënten met chronische nierschade en hypertensie met urineonderzoek op albuminurie (albumine creatinineratio) in de afgelopen 12 maanden in praktijkpopulatie</p>
2	<p>Percentage patiënten met episode nierfunctiestoornis, U99.01 (teller) bij patiënten met een eGFR bepaling (laatste waarde ooit) en eGFR < 60 ml/min/1,73 m² bij patiënten met risico op CNS in de volledige praktijkpopulatie (noemer)</p> <p>Let op: dit betreft alle patiënten in de huisartspraktijk ongeacht zorgprogramma of hoofdbehandelaar.</p>
3	<p>Percentage patiënten met risico op chronische nierschade en een episode nierfunctiestoornis, U99.01, met contra-indicatie 'verminderde nierfunctie'</p> <p>LET OP: dit betreft alle patiënten in de huisartspraktijk ongeacht zorgprogramma of hoofdbehandelaar. De noemer is: patiënten met risico op chronische nierschade met een episode nierfunctiestoornis, U99.01 in praktijkpopulatie</p>